



راهنمای تجویز داروی یمترکسد

نام دارو	کاربرد خدمت	افراد صاحب صلاحیت چیز تحویز	ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	محل ارائه خدمت	شرط تحویز		محل ارائه خدمت	ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	تویهه ها	نوادر خدمت (نمودار دفاتر و فوایل خدمت)	شروع تحویز
					کنترل اندیکاسیون	اندیکاسیون					شروع تحویز
پیترکسید	۹	۹	۹	۹	پیروزال مژه نیوموگام بدهیمه:	- داروی پیترکسید در یک درمان مؤلفی مدلاینه (دیجوتات یا تو ندوخت) در stage ۱-۲ پیماری قابل تجویز است.	- داروی پیترکسید در خط اول درمان بیماران میتابستیک با غیر قابل جراحی به همراه سیس بلاین، گور بلاین یا سونرت نک داروی قابل تجویز است.	- داروی پیترکسید در خط دوم درمان بیماران میتابستیک با غیر قابل جراحی قابل تجویز است.	- ارایه گزارش پایلوزوی با IHC مینی بر اینلاعه به بیماران غیر میتابستیک با دوز ۵-۰ mg/m <sup>2</sup> در روز اول هر ۲۱ روزه و براي ۴ توره	- به منظور کاهش احتمال بروز عوارض جانبی ناشی از اینمازیت پایلوزوی بد خشم در موارد با سیستمیت پایلوزوی با اینمازیت پایلوزوی با IHC مینی بر اینلاعه از اینمازیت پایلوزوی بایز است.	- ارایه گزارش پایلوزوی بردازی قدرصیه مینی بر اینمازیت پایلوزوی بایز است.
NSCLC	۹	۹	۹	۹	کانسر و غیر سلول کوچک به غیر از ساب اسکوموس (SCC):	- داروی پیترکسید در یک درمان مؤلفی مدلاینه (دیجوتات یا تو ندوخت) در بیماران قابل جراحی همراه سیس بلاین با کنکوواتن قابل تجویز است.	- داروی پیترکسید به عنوان خط اول درمان بیماران میتابستیک غیر قابل جراحی که کلیدی کموترکی (None mutant EGFR) هستند به همراه کموترکی پایه با بلاین قابل تجویز است.	- داروی پیترکسید به عنوان درمان maintenance در بیماران میتابستیک غیر قابل جراحی که کلیدی کموترکی (None mutant EGFR) هستند به عنوان داروی قابل تجویز است.	- داروی پیترکسید در بیماران قابل جراحی همراه سیس بلاین با اینمازیت EGFR بر این معونه از اینمازیت PCR	- ارایه گزارش پیش بند موجو مواسیون در طبق اینمازیت پایلوزوی تحریز است. در خط دوم درمان اینمازیت پایلوزوی تحریز است.	- ارایه گزارش پیش بند موجو مواسیون در طبق اینمازیت پایلوزوی تحریز است. در خط دوم درمان اینمازیت پایلوزوی تحریز است.